


La tuberculosis se propaga cuando una persona enferma tose, canta o habla y usted respira el aire contaminado con los microbios de la tuberculosis.


Tomar su medicina para la tuberculosis es muy importante. Necesita tomar la medicina para mejorarse y evitar contagiar a otras personas con los microbios de la tuberculosis.




Esta enfermedad se contrae cuando los microbios de la tuberculosis se multiplican, y atacan los pulmones y otras partes del cuerpo. Cuando esto ocurre:

- ◆ Usted tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- ◆ Se siente enfermo con tos, tiene fiebre, pérdida de peso, dolor en el pecho o sudores nocturnos.
- ◆ Tiene microbios de la enfermedad de tuberculosis en su cuerpo.
- ◆ Puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- ◆ Puede tener una radiografía de tórax anormal.


Alto a la Tuberculosis




Puede tomar medicinas para el tratamiento de la **INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE** y evitar llegar a tener la **ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS**.



Los microbios entran en sus pulmones. De allí, pueden irse a otras partes de su cuerpo.



Su organismo lucha contra los microbios de la tuberculosis.



Si su cuerpo logra controlar los microbios, usted tendrá la **INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE**. Cuando esto ocurre:

- ◆ Tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- ◆ No se siente enfermo.
- ◆ No tiene síntomas de tuberculosis.
- ◆ No puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- ◆ Tiene radiografía de tórax normal.

